



Virus de la hepatitis A (VHA)

Alerta para proveedores de atención médica

Departamento de Salud de Florida • FloridaHealth.gov

Proteger

Vacunar a los pacientes de alto riesgo.

La vacuna se administra en 2 inyecciones, con un intervalo de 6 meses entre cada una. Los pacientes necesitan ambas inyecciones para que la vacuna tenga efecto a largo plazo.

El diagnóstico se realiza con la confirmación de una prueba de IGM en suero. Informe los casos de VHA a su CHD.

El tratamiento es de apoyo.

La prevención se realiza a través de la vacunación de las personas en riesgo de contraer la infección.



¿Su paciente tiene un alto riesgo de contraer el VHA?

Una persona en riesgo de contraer el VHA es alguien que:

- Está en contacto directo, cuida o vive con alguien que tiene el VHA.
- Usa drogas inyectables o no inyectables.
- No tiene hogar o se encuentra en una vivienda temporal.
- Ha estado en la cárcel recientemente.
- Es un hombre que ha tenido relaciones sexuales con otros hombres.
- Ha visitado recientemente un país donde el VHA es común.
- Tiene relaciones sexuales con alguien que tiene el VHA.



Síntomas:

- Dolor de estómago
- Náuseas y vómitos
- Ictericia
- Diarrea
- Pérdida del apetito
- Dolor articular
- Heces pálidas o de color arcilla
- Fiebre
- Cansancio
- Orina de color oscuro

Educar a los pacientes

El VHA:

- Se transmite de persona a persona por la ingestión de pequeñas cantidades de materia fecal de una persona con el VHA.
- Puede transmitirse a través de la actividad sexual.
- Las personas que están enfermas con el VHA deben evitar el contacto sexual.
- Las personas que están en riesgo de contraer el VHA deben vacunarse.

Lávese las manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos:

ANTES DE

- Preparar o trabajar con alimentos que no estén envasados.

DESPUÉS DE

- Usar el baño.
- Cambiar un pañal.
- Toser, estornudar o usar un pañuelo o pañuelo de papel.



LOS DESINFECTANTES PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL NO MATAN LOS GÉRMENES DEL VHA.

No:

COMPARTA

Toallas, cepillos de dientes o utensilios para comer.

TOQUE

Alimentos, bebidas, drogas o cigarrillos que hayan sido manipulados por una persona con el VHA.

Comente la necesidad de vacunación a cualquier persona que usted conozca que pueda estar en riesgo.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea obtener más información?

Comuníquese con el Departamento de Salud de Florida:

Obtenga más información:
FloridaHealth.gov/hepa
CDC.gov/Hepatitis,
Immunize.org/Hepatitis-A

